

به نام خدا

شرکت ساتین تن کیمیا تولیدکننده داروهای دامپزشکی
تقدیم می کند

جدول بیماری‌های رایج در خرگوش‌ها

به همراه اطلاعات فیزیولوژیک

Disease, Treatment, and Prevention Table



تالیف و ترجمه :

واحد R&D شرکت ساتین تن کیمیا

علی شیدائی

لوسیون دارویی گوش ساتینوت



لوسیون دارویی مخصوص گوش



⊕ ضدباکتری

⊕ ضدقارچ

⊕ ضدکک و جرب



Satinvet

📷satinvet

📞 Phone number
0993 84 84 977

هم برای پیشگیری و هم برای درمان
میتوان استفاده کرد

داروی مولتیفانکشنال بورآز



Satin Vet

کاربردهای بورآز

1 (ترمیم زخم و جراحات و فیستول

2 (درمان درماتیت های پوستی نظیر درماتوفیتوز

3 (بهترین دارو برای ترمیم زخم و جلوگیری از عفونت پس از جراحی **بدون نیاز به آنتی بیوتیک**

4 (درمان استوماتیتها و زخمهای داخل دهانی (مانند FCV گربه ها)

5 (التیام موضع گزیدگی ناشی از (جرب ، کک و کنه و ...) همراه با خاصیت ضدانگلی خارجی

6 (درمان ضایعات پوستی نظیر آبسه ، آکنه ، زگیل و

ویژگی‌ها

1 (خاصیت آنتی بیوتیکی وسیع الطیف با اثربخشی کامل

2 (کنترل بسیار بالای عفونت و رطوبت

3 (افزایش دهنده تولید بافت پوششی و رگ‌زایی در بافت

4 (کمک به جمع شدن سریع پوست

5 (خاصیت آنتی اکسیدانی بالا

6 (در صورت لیس زدن مسمومیت نمیدهد

Disease	Cause	Signs and Symptoms	Prevention	Treatment*
آبسه Abscesses	عفونت باکتریایی	بزرگ شدن زیر پوست نزدیک فک. می تواند در سایر قسمت های بدن که زخم یا خراش وجود دارد نیز رخ دهد.	جنگ بین خرگوش ها را به حداقل برسانید. اشیاء تیزی که می توانند به خرگوش آسیب بزنند را از دسترس او دور کنید.	خز اطراف آبسه ها را قیچی کنید، سپس با سوزن سوراخ کنید و چرک را خارج کنید. با پراکسید ضد عفونی کنید و از پماد یا پودر آنتی بیوتیک مجاز برای تسریع بهبودی استفاده کنید. (اسپری بورآز دارویی مناسب برای درمان آبسه ها)
غدد پستانی مسدود شده Caked mammary glands	تولید شیر بیش از مصرف است. تعداد نوزادان کم است یا نوزادان شیر نمیخورند .	یک یا چند غده پستانی ممکن است متورم، داغ و سفت شوند. اغلب با ورم پستان اشتباه گرفته می شود.	مقدار خوراک را در روز زایمان ماده خرگوش به نصف کاهش دهید و سپس به تدریج در طی 7 روز به مقدار کامل افزایش دهید .	با دوشیدن جزئی، مقداری از احتقان را تسکین دهید. غده را با پماد ضد التهاب ماساژ دهید.
کوکسیدیوز Coccidiosis	پنج گونه مختلف از تک یاخته ها (حیوانات تک سلولی) که می توانند به مجاری صفراوی، روده یا سکوم آسیب برسانند.	عمدتاً خرگوش های جوان را تحت تأثیر قرار می دهد. در موارد شدید، علائم شامل اسهال، از دست دادن گوشت، شکم برآمده، از دست دادن اشتها و زبری پوشش خز است. کبد ممکن است لکه های سفید داشته باشد و بزرگ شود و ممکن است خونریزی های کوچکی در روده وجود داشته باشد.	قفس یا محل نگداری را تمیز نگه دارید و از آلودگی مدفوع به خوراک یا آب جلوگیری کنید. از قفس های دارای کف سیمی استفاده کنید.	سولفاکینوکسالین به مدت 2 هفته به طور مداوم در خوراک یا آب آشامیدنی.
التهاب ملتحمه «چشم گریان» Conjunctivitis “Weepy Eye”	التهاب پلک چشم. می تواند ناشی از تحریک توسط گرد و غبار، اسپری ها، بخارات یا عفونت باکتریایی باشد.	اشک بیش از حد تولید می شود و مایع تیره ای از گونه سرازیر می شود. خرگوش چشم هایش را با پاهای جلویی اش می مالد که این وضعیت را بدتر می کند. خرگوش های سرماخورده (سرفه خرگوشی) معمولاً چشم های ترش می دارند .	منابع (گرد و غبار، خاک) محرک را به حداقل برسانید. خرگوش های مبتلا به عفونت مزمن را از محل دور کنید.	از یک محصول شستشوی چشم تجاری برای پاک کردن گرد و غبار، آلودگی یا سایر اجسام خارجی استفاده کنید. اگر التهاب ادامه پیدا کرد، یک پماد چشمی حاوی آنتی بیوتیک می تواند مفید باشد.
کانکر گوش Ear Canker	جرب گوش	پوسته یا دلمه در پایه گوش داخلی شروع به تشکیل شدن می کند. مایت ها (جرب ها) باعث تحریک قابل توجهی می شوند و خرگوش سر خود را تکان می دهد و سعی می کند گوش هایش را با پاهای عقبی بخاراند.	اجازه ندهید خرگوش های سالم با خرگوش های مبتلا به عفونت گوش تماس پیدا کنند. ماهی یک بار سه قطره روغن در گوش خرگوش ها بریزید.	با استفاده از یک گوش پاک کن روغن معدنی، گیاهی یا زیتون را روی تمام پوسته های قابل مشاهده بمالید. داروی ضد انگل تزریق کنید یا بمالید. (لوسیون گوش بورآز برای درمان کمک کننده است)

Disease	Cause	Signs and Symptoms	Prevention	Treatment*
التهاب روده: اسهال Enteritis: Diarrhea	احتمالاً ناشی از کوکسیدیوز یا سایر التهابات روده است. در خرگوش‌های جوان، مصرف بیش از حد "سبزیجات" باعث اسهال می‌شود.	اسهال آبکی ممکن است تنها علامت باشد.	برنامه‌ای برای کنترل کوکسیدیوز تدوین کنید. به خرگوش‌ها «سبزیجات» ندهید.	خرگوش‌ها را در شرایط راحتی نگه دارید و آنها را به خوردن غذا تشویق کنید. غذای غنی‌شده با دارو یا ویتامین می‌تواند مفید باشد.
موکوئید Mucoid	تصور می‌شود که ناشی از یک ماده محرک، سم یا سایر عوامل استرس‌زا مانند تغییرات رژیم غذایی، آنتی‌بیوتیک‌ها و سفر باشد. تصور نمی‌شود که مسری باشد.	با دمای بدن پایین‌تر از حد طبیعی، از دست دادن اشتها، افسردگی، پوشش خز خشن، دندان قروچه، کم آبی بدن، نفخ شکم و اسهال حاوی مواد مخاطی مشخص می‌شود.	از تعداد و شدت عوامل استرس‌زا در محیط جلوگیری کنید یا آنها را کاهش دهید. بهداشت قفس‌ها، تجهیزات تغذیه و آبخوری را به شدت رعایت کنید.	هیچ درمان موفقیت‌آمیزی شناخته نشده است، اما با تغذیه با غذای غنی‌شده با دارو یا ویتامین، می‌توان مرگ و میر را کمی کاهش داد. تمام خرگوش‌های مبتلا را معدوم کنید.
عفونت چشم Eye Infection	چندین نوع باکتری.	چشم‌های بچه خرگوش‌ها ممکن است بسته بماند و چرک در اطراف چشم‌ها مشاهده شود.	از سرما و سایر عوامل استرس‌زا جلوگیری کنید.	پماد چشمی ضد باکتری بزنید.
توده خز "توپ مو" Fur Block "Hair Ball"	خرگوش در مدت زمان کوتاهی مقدار زیادی از موی خود یا خرگوش دیگری را می‌بلعد.	خرگوش به طور پراکنده مقدار کمی غذا می‌خورد. یک توده سفت در معده قابل لمس است.	توده خز بیشتر در خرگوش‌های آنگورا مشاهده می‌شود.	دوز خوراکی ½ اونس (14 گرم) روغن معدنی ممکن است مؤثر باشد. اگر توده خز خیلی بزرگ باشد، برداشتن آن با جراحی ضروری است.
عفونت قارچی Fungus Infection	قارچ	پوست خشک و پوسته پوسته (شوره سر) روی شانه‌ها و پشت. همچنین می‌تواند در سایر قسمت‌های بدن نزدیک منافذ مخاطی (مانند چشم و بینی) نیز ظاهر شود.	از تماس با خرگوش‌های مبتلا جلوگیری کنید.	تولنافتات tolinaftate را روی ناحیه آسیب دیده بمالید. داروهای دیگری نیز موجود است. اسپری بورآز برای درمان عفونت‌های قارچی مؤثر است.

Disease	Cause	Signs and Symptoms	Prevention	Treatment*
گرمزدگی Heat Exhaustion	دمای بیش از حد بالا (بالای 29 درجه سانتی گراد) و رطوبت بالا (بالای ۷۰٪)، چاقی، تهویه نامناسب، آب ناکافی و ازدحام جمعیت.	افزایش میزان تنفس (له له زدن)، بیحالی و ترشح بیش از حد بزاق. خرگوش‌های ماده باردار و بچه های درون لانه بیشتر مستعد ابتلا هستند.	سایه، جریان هوای کافی، و مقدار زیادی آب خنک در یک روز گرم فراهم کنید. یک بطری آب یخ زده که به قفس بسته شده باشد به خنک شدن کمک می کند.	خرگوش‌هایی که از گرمزدگی رنج می‌برند را می‌توان در آب ولرم غوطه‌ور کرد تا دمای بدنشان به دمای طبیعی ۱۰۱ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت کاهش یابد. یک کمپرس سرد روی گوش‌هایشان قرار دهید.
سوختگی ادراری Hutch Burn	معمولاً با لانه‌های خیس و کثیف مرتبط است. ادرار و مدفوع باعث تحریک و عفونت پوست می‌شوند.	معمولاً یک پوسته قهوه‌ای رنگ نواحی آلوده را می‌پوشاند و ممکن است ترشحات خونریزی دهنده مشاهده شود.	اجازه ندهید مدفوع در لانه جمع شود.	ناحیه آسیب دیده را با صابون میکروب کش تمیز کنید و آن ناحیه را تمیز نگه دارید. (اسپری بورآز برای انواع سوختگی ها و التهاب مناسب است)
کتوز Ketosis	چاقی، توله‌های بزرگ، کمبود ورزش.	معمولاً درست قبل یا درست بعد از روشن زایمان اتفاق می‌افتد. از غذا خوردن دست می‌کشد و غذا نمی‌خورد.	از چاق شدن بیش از حد گوزن‌های جوان جلوگیری کنید و مطمئن شوید که گوزن‌ها در زمان روشن کردن آتش، غذا می‌خورند.	با محدود کردن خوراک به ۴ تا ۶ اونس (113 تا 170 گرم) در روز برای خرگوش‌های ماده می‌توان از چاقی جلوگیری کرد.
ورم پستان «سینه‌های آبی» Mastitis “Blue Breasts”	عفونت باکتریایی در غده پستانی که در اثر آسیب ناشی از لانه، قفس یا گاز گرفتن توسط بچه شیرخوار ایجاد می‌شود.	غده پستانی قرمز رنگ، متورم، حساس و ممکن است رگه‌های آبی تیره ظاهر شود.	هر احتمالی که باعث آسیب به غدد پستانی در هنگام ورود خرگوش ماده به لانه می شود را کاهش دهید . نوزادان را به یک ماده شیرده دیگر انتقال ندهید .	پنی‌سیلین در برابر استافیلوکوک یا استرپتوکوک یا ارگانیسم‌های مشابه مؤثر است.
مال اکلوزن یا عدم تطابق "دندان‌های باک" Malocclusion “Buck Teeth”	یک بیماری ارثی است که با رشد بیش از حد دندان‌های جلویی مشخص می‌شود.	دندان‌های پایین بیرون زده و دندان‌های بالا به سمت داخل دهان انحنا پیدا می‌کنند.	از خرگوش‌هایی که دندان‌های باکی دارند برای جفت‌گیری استفاده نکنید.	دندان‌های خرگوش‌های جوان را می‌توان تا زمانی که به وزن کشتار برسند، کوتاه کرد. (خارج از کتاب : کوتاه کردن دندان معمولاً فقط در مواردی مانند مال اکلوزن ضروری است . در شرایط عادی دندان های خرگوش با جویدن علوفه و یونجه به طور طبیعی ساییده می شوند . اگر خرگوش ها برای گوشت پرورش داده میشوند معمولاً تا رسیدن به وزن کشتار 8 تا 12 هفتگی ، نیاز به کوتاه کردن دندان ندارند .

Disease	Cause	Signs and Symptoms	Prevention	Treatment*
پاستورلوز "اسنافلز"(علایم تنفسی مثل سرفه عطسه ، خرخر کردن) Pasteurellois "Snuffles"	یک بیماری مزمن دستگاه تنفسی فوقانی که در اثر عفونت باکتریایی ایجاد می‌شود.	علائم اولیه معمول عبارتند از: ترشحات بینی، آبریزش چشم، تکان دادن سر، عطسه یا صدای خرخر در تنفس و کاهش وزن. در صورت ادامه عفونت ممکن است خرگوش‌ها نابارور شوند .	تمام خرگوش‌های جدید را به مدت ۳ هفته قرنطینه کنید. خرگوش‌هایی را که علائم مزمن بیماری را نشان می‌دهند، معدوم کنید. عوامل استرس‌زا را کاهش دهید و مدیریت و اقدامات بهداشتی خوبی داشته باشید..	دادن تتراسایکلین همراه با غذا ممکن است در موارد بدون عارضه مؤثر باشد. برای درمان دقیق، ارگانیزم باید کشت داده شده و شناسایی شود.
پنومونی Pneumonia	عفونت باکتریایی یا ویروسی که معمولاً با سایر بیماری‌های تنفسی یا عوامل استرس‌زا مانند رطوبت، جریان هوا و شرایط غیربهداشتی در قفس‌ها همراه است.	تب بالا، تنفس سخت، ترشحات بینی و از دست دادن اشتها از علائم آن هستند.	کنترل «اسنافلز»(پاستورلوز) موارد ابتلا به ذات‌الریه را کاهش می‌دهد. کوران هوا و شرایط مرطوب را از بین ببرید.	درمان ممکن است بسته به عامل ایجاد کننده متفاوت باشد. یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف ممکن است مفید باشد.
رینگ ورم Ringworm	یک عفونت قارچی که می‌تواند در هر قسمتی از بدن ظاهر شود اما اغلب روی سر رخ می‌دهد. این عفونت قارچی می‌تواند به انسان منتقل شود.	ریزش مو به صورت لکه‌های دایره‌ای. پوسته‌ای زردرنگ تشکیل می‌شود که ظرف حدود ۳ هفته می‌ریزد. اگر عفونت درمان نشود، خارش قابل توجهی ایجاد می‌شود.	اجازه ندهید خرگوش‌های آلوده با خرگوش‌های دیگر تماس داشته باشند. هنگام دست زدن به خرگوش آلوده، دستکش بپوشید.	خز اطراف ناحیه آسیب دیده را کوتاه کنید و با تولنافتات درمان کنید. داروهای دیگری نیز موجود است. اسپری بورآز و از آن بهتر ، پماد ضدقارچ شرکت ساتین تن کیمیا برای درمان بسیار مؤثر است .
سالمونلوز " اسکورز " (اسهال شدید) Salmonellosis "Scours"	چندین عضو از گروه باکتری‌های سالمونلا می‌توانند خرگوش‌ها را تحت تأثیر قرار دهند.	علائم عمومی عبارتند از اسهال، کاهش وزن، التهاب ملتحمه و تنفس سریع.	شیوه‌های صحیح پرورش و قرنطینه خرگوش‌های جدید الورود.	تتراسایکلین در خوراک ممکن است مؤثر باشد.
جرب پوست Skin Mange	هجوم جرب‌هایی که در پوست نفوذ می‌کنند و باعث تحریک قابل توجهی می‌شوند. جرب‌های مانژ که سگ‌ها و گره‌ها را آلوده می‌کنند، می‌توانند خرگوش‌ها را نیز آلوده کنند.	ریزش مو، پوسته پوسته شدن پوست و خارش شدید و خاراندن وجود خواهد داشت.	خرگوش‌های آلوده باید جدا و درمان شوند. محل نگهداری باید ضدعفونی شود.	پودرپاشی با یک حشره کش تایید شده برای درمان جرب پوستی انجام شود . درمان باید پس از 7 روز تکرار گردد . اسپری بورآز علایم پوستی مانند خارش را کاهش میدهد .

Disease	Cause	Signs and Symptoms	Prevention	Treatment*
زخم پاشنه Sore Hocks	ناحیه کبود یا عفونی در سطح زیرین مفصل هوک . عوامل استرس‌زای مرتبط عبارتند از قفس کشیف، سطوح ناهموار کف ساخته شده با شبکه سیمی با اندازه نامناسب.	دل‌مه‌ها معمولاً در کف پاهای عقب ظاهر می‌شوند. ممکن است کف پا و انگشتان پا عفونی شوند. خرگوش‌های عصبی و سنگین وزن بیشتر مستعد ابتلا به این بیماری هستند. نژاد رکس نیز همین‌طور.	اجازه ندهید بستر خیس و فضولات جمع شوند. اشیاء تیز را از روی زمین بردارید.	مفصل خرگوشی را با صابون میکروب‌کش بشویید و یک ماده ضدعفونی‌کننده مانند تنتور ید روی آن بمالید. اسپری بورآز به تنهایی برای درمان این بیماری کافیست
اسپیروکتوزیس «بیماری منفذ تناسلی - دفعی» Spirochetosis "Vent Disease"	عفونت توسط یک اسپیروکت (باکتری‌های گرم منفی مارپیچی) اتفاق می‌فتد و می‌تواند از طریق جفت‌گیری منتقل شود.	تاول یا پوسته روی غدد جنسی ایجاد می‌شود.	همیشه قبل از جفت‌گیری، مولدین را بررسی کنید. همه خرگوش‌های جدید را ایزوله کنید.	تزریق پنی سیلین بهترین درمان است. تا زمانی که تمام ضایعات از بین نرفته‌اند، جفت‌گیری نکنید. از اسپری بورآز روی ضایعات می‌توانید استفاده نمایید . (خارج از کتاب : نام دیگر : سفلیس یا ترپونمیا ز خرگوش)
بیماری تایزر Tyzzar's Disease	یک عفونت باکتریایی که معمولاً با عوامل استرس‌زا و بهداشت ضعیف مرتبط است.	شکل حاد منجر به اسهال، کم آبی بدن و مرگ در عرض ۴۸ ساعت می‌شود.	بهترین اقدامات پیشگیرانه، استفاده از حیوانات سالم و رعایت شیوه‌های صحیح پرورش است.	درمان با آنتی بیوتیک ها خیلی موثر نیست.
آبسه یا تورم ناشی از لارو واربلز Warbles	رشد لارو مگس (botfly) زیر پوست.	تاول‌ها را می‌توان به صورت برآمدگی‌های زیر پوست با یک سوراخ کوچک در مرکز مشاهده کرد. این وضعیت دردناک است و خرگوش ممکن است آن ناحیه را لیس بزند.	برای دور نگه داشتن مگس بات ، محل نگهداری خرگوش‌ها را با توری بپوشانید.	لاروها را بدون له کردن خارج کنید. زخم را با صابون میکروب‌کش تمیز کنید یا برای جلوگیری از عفونت، پودر یا پماد آنتی‌بیوتیک بمالید. اسپری بورآز بهترین دارو برای این نوع ضایعات پوستی است .
گردن کج Wry neck	التهاب مکانیسم تعادل در اعماق گوش. التهاب گوش داخلی معمولاً توسط ارگانیسم پاستورلا مولتوسیدا ایجاد می‌شود.	سر به یک طرف کج می‌شود. میزان کج شدن سر به طور قابل توجهی متفاوت خواهد بود، می‌تواند آنقدر شدید باشد که حیوان قادر به ایستادن روی پاهای خود نباشد. آنها معمولاً به خوردن و آشامیدن ادامه می‌دهند.	گردن کج معمولاً با موارد بالای بیماری "اسنافز" همراه است. تهویه کافی در محل نگهداری خرگوش‌ها، موارد "اسنافلز" و گردن کج را کاهش می‌دهد.	از پماد گوش ترامایسین (اکسی‌تتراسایکلین) تزریقی به عنوان پماد گوش استفاده کنید که هر روز به مدت حدود پانزده تا هفده روز در هر دو گوش قرار داده می‌شود. هر چه زودتر درمان شود، اثربخشی آن افزایش می‌یابد. لوسیون گوش بورآز میتواند درمانی موثر برای این بیماری باشد .

Rabbit physiological data

Heart rate: 180-300/minute ضربان قلب

Respiratory rate: 30 – 60 /minute تعداد نفس

Body temperature: 38.5 – 40 C دمای بدن

Daily food consumption (pellets): 50g/kg میزان مصرف روزانه غذا (پلیت)

Daily water consumption: 50-15-ml/kg میزان آب مورد نیاز روزانه

Daily urine production: 10-35 ml/kg میزان تولید ادرار در روز

Body weight adult: 1-6kg وزن بدن در بالغین

new-born kit: 30-80g وزن بدن نوزادان

Life expectancy: 5-8 years طول عمر

Diploid chromosome number (2n) = 44 تعداد کروموزوم


HEMATOLOGY

RBC X 10 ¹² /L	Hb g/L	PCV L/L	Platelet X 10 ⁹ /L	WBC X 10 ⁹ /L	Neutrophils 10 ⁹ /L	Lymphocytes 10 ⁹ /L	Blood Vol. ml/ Kg
6.5 4.5-8.5	94- 175	0.40 0.31 -0.50	468 180-750	4.0-13	3.0-5.2	2.8-9.0	57-65

مقادیر نرمال ممکن است بسته به سن، جنس، نژاد و عملکرد حیوانات متفاوت باشد.


روش های مهار :

خرگوش ها باید با آرامش و ملایمت جابجا شوند ، در غیر این صورت ممکن اتس دچار شوک یا فروپاشی عصبی شوند . آنها را باید با گرفتن گردن یا شکمشان بلند کرد . هرگز نباید آنها را با گوش هایشان بلند کرد . این کار باعث درد می شود .



روش صحیح حمل خرگوش : خرگوش را با پوست ناحیه شانه ها بلند کنید و آن را با قرار دادن انگشت شست و سبابه در قسمت بالای کفل حمل نمایید . حمایت و پشتیبانی از بدن حیوان کاملاً ضروری است .





مطالب مفید دامپزشکی را میتوانید در پیج انیستاگرامی ما دنبال کنید .

@satinvet
04134754033
09938484977



دانلود کاتالوگ

۰۲۱۳۴۷۵۴۰۳۳۳
منتظر تماس شما هستیم

خانه محصولات اخبار تحقیق و توسعه کارخانه تماس با ما

شرکت داروسازی ساتین شیمی
تولید کننده داروهای دامی و انسانی

Satin



Satin Satinvet



دام سالم زندگی سالم شعار ماست

اولین شرکت دانش بنیان در حوزه تولید محصولات دامی در شمال غرب کشور

شرکت ما در سال ۱۳۹۸ با هدف ارتقاء سلامت جامعه تأسیس شد و پس از کسب تجربه در صنعت داروسازی، به تولید داروهای دامی پرداخت. با توجه به نیاز بازار و بهره‌گیری از تیم تحقیق و توسعه، اکنون به تولید داروهای انسانی نیز اقدام کرده‌ایم. هدف ما ارائه محصولات با کیفیت بالا و ایمن برای بهبود سلامت انسان‌ها و حیوانات است و به دنبال افزایش سهم خود در صنعت داروسازی هستیم.

کنترل خونریزی ناحیه سم

19°C Cloudy

Search



11:18 AM
5/4/2025

همچنین تمام مطالب آموزشی را میتوانید از سایت شرکت بصورت رایگان دانلود کنید .

<https://satindarou.ir>