



سندروم اهلرز دانلوس

Feline Cutaneous Asthenia



Ehlers-Danlos syndrome

آستنی یا ضعف پوستی در گربه (FCA)، که نام دیگر سندروم اهلرز-دانلوس میباشد، یک بیماری است که با ساختار **کلاژن غیرطبیعی** مشخص میشود. کلاژن مولکول پروتئینی لازم برای ایجاد قدرت و کشش پوست و رباطها است، که در بیشتر قسمت های بدن وجود دارد.



Ehlers-Danlos syndrome

این بیماری ناشی از یک **ج Mesh ژنتیکی** است که از والدین به فرزندان منتقل می‌شود. این وضعیت با نمونه‌های پوستی و بافتی قابل تشخیص نیست، از طریق مشاهده تشخیص داده می‌شود.

کلاژن نوعی "چسب" است که بدن را در کنار هم نگه می‌دارد و کمبود کلاژن باعث سنتز غیر طبیعی کلاژن و تشکیل فیبر می‌شود. حیوانات مبتلا به این اختلال از دررفتگی در دنایک در مفاصل به دلیل بی ثباتی رشته‌های لیگامانی که استخوان‌ها را به یکدیگر نگه می‌دارند، رنج می‌برند. رباط‌ها معمولاً با حرکت کشیده می‌شوند، اما بدون خاصیت ارتجاعی لازم برای بازگشت به شکل اولیه‌شان، کشیده می‌مانند و به استخوان‌ها اجازه می‌دهند از مفاصل همبند خود خارج شوند. این یک محیط فیزیکی در دنایک برای فرد مبتلا به آستنی پوستی ایجاد می‌کند. کمبود کلاژن بر ساختار پوست نیز تأثیر می‌گذارد. بدون خاصیت ارتجاعی، وقتی پوست از بدن کشیده شده باشد، به بدن بازنمی گردد و در نهایت به شدت **افتادگی** می‌کند. این شلی همچنین انعطاف پذیری پوست را ضعیف می‌کند و باعث می‌شود پوست به راحتی آسیب بیند و مستعد پارگی، کبودی و زخم شود. این بیماری نادر است و تنها در تعداد کمی از گربه‌ها به وضوح شناسایی شده است. حیوانات معمولاً در سنین پایین تشخیص داده می‌شوند.



نشانه ها

علائم آستنی پوستی عموماً شامل افتادگی پوست **saggy skin**، با چین های اضافی پوست است. پوست نرم، ظریف و نازک است و خاصیت ارتجاعی کافی ندارد. پوست به راحتی پاره می شود و اغلب زخم های پنهانی از نوع «دهان ماهی» بر جای می گذارد که خونریزی بسیار کمی دارد، اما زخم هایی بر جای می گذارد که به مرور زمان گشاد می شوند. همچنین ممکن است اسکارهایی روی پوست وجود داشته باشد که شناسایی نشده باشند. گربه شما ممکن است تورم زیر پوست آرنج داشته باشد، به این دلیل که استخوان ها هنگام استراحت گریه به پوست فشار می آورند و در زیر پوست (هماتوم) آرنج ها و سراسر بدن کبودی و خونریزی می کند. پارگی در پشت و سر نیز شایع است. کلاژن در داخل و خارج بدن کم است و باعث می شود ساختارهای داخلی پاره شوند و در نتیجه خونریزی داخلی ایجاد شود.



درمان

این بیماری غیرقابل درمان است و پیش آگهی خوبی ندارد. بسیاری از صاحبان حیوانات خانگی با توجه به درد مزمنی که حیوان خانگی ممکن است متحمل شود و زمان صرف شده برای درمان رخمهای مزمن، حیوانات خانگی خود را معدوم می کنند. اگر انتخاب کنید که حیوان خانگی خود را نگهداری کنید، باید حیوان خانگی تنها در خانه باشد یا کاملاً از سایر حیوانات خانگی جدا شده باشد. شما باید محیط آن را عاری از گوشه های تیز و سایر خطرات نگه دارید و مکان های خواب و استراحت را طوری ترتیب دهید که به خوبی پوشانده شوند. برای جلوگیری از پارگی های بزرگ پوست، باید گربه خود را با دقیق نگهداری و همیشه به بازدید کنندگان از وضعیت گربه خود اطلاع دهید تا صدمات تصادفی مشکلی ایجاد نکند.



Dobro hrušvane veterinary clinic

درمان

برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود، باید ناخن گربه گرفته شود و از هر موقعیتی که ممکن است باعث احساس خارش گربه شما شود باید اجتناب شود (مانند حشرات، گرده گل، آلرژی ناشی از غذاهای جدید). نیازی به گفتن نیست که عقیم سازی ضروری است. این نه تنها برای جلوگیری از انتقال ژن جوش یافته، بلکه به دلیل صدماتی است که می تواند در طول جفت گیری رخ دهد. کمبود ذاتی کلاژن بارداری را غیرممکن می کند.