

The logo for Satinvet features the word "Satinvet" in a white, sans-serif font. A red cross is positioned over the "i" in "Satin".

Satinvet

Innovation in Veterinary Pharmaceuticals

- ضد درد
- ترمیم کننده
- ضد عفونی کننده
- ضد التهاب
- اسپری دارویی موضعی

ترکیبات فعال : هر ۱۰۰ میلی لیتر حاوی
 بوریک اسید ۴ گرم
 کلرهگزیدین دی گلوکونات ۰/۰۱ گرم
 عصاره میخک (اوژنول) ۱ گرم
 ویولت دوژانسین ۰/۰۲ گرم
 کربومر ۹۴۰ Qs to Gel formation



مکانیسم اثر :

اسید بوریک، عاملی برای استفاده در زخم‌ها به دلیل خواص ضد عفونی کنندگی آن است و همچنین اثرات مثبت آن بر رگ‌زایی، سنتز کلاژن و اپیتلیال سازی مجدد مورد توجه قرار گرفته است. عنصر بورون مشتق شده از بوریک اسید علاوه بر خاصیت ضد عفونی کنندگی با بیان ماتریکس خارج سلولی باعث افزایش اثرات ترمیمی پوست و مخاط می شود. کلرهگزیدین در کنار بوریک اسید خاصیت ضد عفونی کنندگی این محصول را افزایش می دهد. حالت هیدروژلی محصول (کربومر) نوعی پانسمان برای ضایعات و زخم ها محسوب می شود و به حفظ شرایط پایدار پوست و مخاط کمک میکند. اوژنول چندین اثر فارماکولوژیک مشابه با بی حس کننده های موضعی دارد که شامل مهار کانال سدیم ولتاژدار (VGSC) و فعال شدن گیرنده ۱ وانیلوئید (TRPV1) است.

موارد مصرف:

- التیام انواع زخم های بسته ، باز و عفونی پوستی
- ضد عفونی کننده و التیام بخش زخم ها پس از جراحی بدون نیاز به آنتی بیوتیک
- التیام زخم ها و بثورات مخاطی (همانند زخم های دهانی ناشی از تب برفکی ، طاعون نشخوار کنندگان کوچک ، اکتیما واگیر)
- کاهش دهنده درد ناشی از زخم ها و بثورات دهانی و متعاقبا کمک به بازگشت تغذیه حیوان
- ضد عفونی کننده مخاط (شستشوی داخل رحمی ، زخم کولون در هنگام توشرکتال)
- پیشگیری و درمان عفونت پس از شاخ بری و شاخ سوزی
- درمان درمانیت های پوستی ناشی از باکتری ها ، قارچ ها و ویروس ها
- درمان آکنه ، آبه ، زگیل ، ضایعات آبله و
- کاهش دهنده خارش و التهابات ناشی از عفونت ها
- التیام انواع سوختگی ها

Satinvet



مقدار و روش مصرف :

روزانه سه بار به موضع درگیر اسپری شود . زخم ها قبل از استفاده توسط دامپزشک تازه سازی (دبریدمان) شوند . تا بهبودی کامل از آفتوبور استفاده نمایید .

زمان پرهیز از مصرف : ندارد

موارد منع مصرف :

در اسب ، سگ و گربه استفاده نشود . در مواردی که به ترکیبات دارو حساسیت وجود دارد استفاده نشود .

موارد احتیاط :

فقط جهت مصرف دامپزشکی . دور از دسترس کودکان نگهداری شود .

تداخل دارویی :

اسپری آفتوبور به تنهایی یک ضد عفونی کننده قوی و وسیع الطیف است و ممکن است با سایر داروهای ضد عفونی کننده و آنتی بیوتیکی دچار سینرژیسم اثر شود و التهابات را افزایش دهد .

شرایط نگهداری :

در ظروف در بسته و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود .

بسته بندی :

ظروف ۲۰۰ میلی لیتری



- ترمیم کننده
- ضد عفونی کننده
- ضد التهاب
- اسپری دارویی موضعی

ترکیبات فعال :
 بوریک اسید
 کلرهگزیدین دی گلوکونات
 ۱۰۰ میلی لیتر حاوی
 ۳ گرم
 ۰/۰۱ گرم
 Qs to Gel formation
 ۹۴۰ کربومر



مکانیسم اثر :

اسید بوریک، عاملی برای استفاده در زخم‌ها به دلیل خواص ضد عفونی کنندگی آن است و همچنین اثرات مثبت آن بر رگ‌زایی، سنتز کلاژن و اپیتلیال سازی مجدد مورد توجه قرار گرفته است. عنصر بورون مشتق شده از بوریک اسید علاوه بر خاصیت ضد عفونی کنندگی با بیان ماتریکس خارج سلولی باعث افزایش اثرات ترمیمی پوست و مخاط می شود. کلرهگزیدین در کنار بوریک اسید خاصیت ضد عفونی کنندگی این محصول را افزایش میدهد. حالت هیدروژلی محصول (کربومر) نوعی پانسمان برای ضایعات و زخم‌ها محسوب می شود و به حفظ شرایط پایدار پوست و مخاط کمک میکند.

موارد مصرف:

- التیام انواع زخم‌های بسته، باز و عفونی پوستی
- ضد عفونی کننده و التیام بخش زخم‌های جراحی بدون نیاز به آنتی بیوتیک
- التیام انواع سوختگی‌ها
- التیام زخم‌ها و بثورات مخاطی (همانند زخم‌های دهانی ناشی از کلسی ویروس در گربه‌ها)
- درمان انواع عفونت‌ها و التهابات مخاطی (همانند ژینژوئیت‌ها، استوماتیت‌ها، و لولواژنیت‌ها و)
- درمان درماتیت‌های پوستی ناشی از باکتری‌ها، قارچ‌ها و ویروس‌ها
- درمان آکنه، آبسه، زگیل، پوستول
- کاهش دهنده خارش و التهابات ناشی از عفونت‌ها

مقدار و روش مصرف :

روزانه سه بار به موضع درگیر اسپری شود. زخم ها قبل از استفاده توسط دامپزشک تازه سازی (دبریدمان) شوند. همچنین می توانید پدی از جنس کتان را آغشته از بورآز نمایید و بر روی محل بانداز کنید. تا بهبودی کامل از بورآز استفاده نمایید.

زمان پرهیز از مصرف : ندارد

موارد منع مصرف :

در مواردی که به ترکیبات دارو حساسیت وجود دارد استفاده نشود.

موارد احتیاط :

در صورت بلع فقط در دوزهای بسیار بالا میتواند باعث مسمومیت گوارشی شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

تداخل دارویی :

اسپری بوراز به تنهایی یک ضد عفونی کننده قوی و وسیع الطیف است و ممکن است با سایر داروهای ضد عفونی کننده و آنتی بیوتیکی دچار سینرژیسم اثر شود و التهابات را افزایش دهد.

شرایط نگهداری :

در ظروف در بسته و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی :

ظروف ۱۰۰ میلی لیتری



- ترمیم کننده
- ضد عفونی کننده
- دافع حشرات
- ضد التهاب
- اسپری دارویی موضعی

ترکیبات فعال : هر ۱۰۰ میلی لیتر حاوی
 بوریک اسید ۵ گرم
 کلرگزیدین دی گلوکونات ۰/۰۱ گرم
 ۹۴۰ Qs to Gel formation

موارد مصرف:

- التیام انواع زخم های بسته ، باز و عفونی پوستی
- ضد عفونی کننده و التیام بخش زخم های جراحی
- التیام انواع سوختگی ها
- التیام زخم ها و بثورات مخاطی (همانند زخم های دهانی در اسب ها)
- درمان انواع عفونت ها و التهابات مخاطی (مناسب برای شستشو و ضد عفونی داخل رحمی)
- درمان درماتیت های پوستی ناشی از باکتری ها ، قارچ ها و ویروس ها
- درمان آکنه ، آبسه ، زگیل ، پوستول
- کاهش دهنده خارش و التهابات ناشی از عفونت ها



مکانیسم اثر :

اسید بوریک، عاملی برای استفاده در زخم ها به دلیل خواص ضد عفونی کنندگی آن است و همچنین اثرات مثبت آن بر رگ زایی، سنتز کلاژن و اپیتلیال سازی مجدد مورد توجه قرار گرفته است . عنصر بورون مشتق شده از بوریک اسید علاوه بر خاصیت ضد عفونی کنندگی با بیان ماتریکس خارج سلولی باعث افزایش اثرات ترمیمی پوست و مخاط می شود . کلرگزیدین در کنار بوریک اسید خاصیت ضد عفونی کنندگی این محصول را افزایش میدهد . حالت هیدروژلی محصول (کربومر) نوعی پانسمان برای ضایعات و زخم ها محسوب می شود و به حفظ شرایط پایدار پوست و مخاط کمک میکند .

مقدار و روش مصرف :

روزانه سه بار به موضع درگیر اسپری شود . زخم ها قبل از استفاده توسط دامپزشک تازه سازی (دبریدمان) شوند . همچنین می توانید پدی از جنس کتان را آغشته از بورآز نمایید و بر روی محل بانداز کنید . تا بهبودی کامل از بورآز استفاده نمایید .

زمان پرهیز از مصرف : ندارد **موارد منع مصرف :** در مواردی که به ترکیبات دارو حساسیت وجود دارد استفاده نشود

موارد احتیاط : در صورت بلع فقط در دوزهای بسیار بالا میتواند باعث مسمومیت گوارشی شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

تداخل دارویی : اسپری بورآز به تنهایی یک ضد عفونی کننده قوی و وسیع الطیف است و ممکن است با سایر داروهای ضد عفونی کننده و آنتی بیوتیکی دچار سینرژیسم اثر شود و التهابات را افزایش دهد . .

شرایط نگهداری : در ظروف در بسته و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود .

بسته بندی : ظروف ۲۵۰ میلی لیتری





ترکیبات فعال : هر ۱۰۰ میلی لیتر حاوی
 بوریک اسید ۲ گرم
 کلرهگزیدین دی گلوکونات ۰/۰۱ گرم
 سدیم استات ۰/۰۱ گرم
 پلی پروپیلن گلیکول ۰/۰۰۱ گرم
 کربومر ۹۴۰

Qs to Gel formation

- ترمیم کننده
- ضد عفونی کننده
- ضد التهاب
- ژل موضعی

موارد مصرف:

- عفونت های باکتریایی گوش نظیر استافیلوکوکوس ، سودوموناس و پروتئوس
- عفونت های قارچی
- عفونت های ناشی از جرب و آلرژی ها

مکانیسم اثر :

اسید بوریک، عاملی برای استفاده در زخم ها به دلیل خواص ضد عفونی کنندگی آن است و همچنین اثرات مثبت آن بر رگ زایی، سنتز کلاژن و اپیتلیال سازی مجدد مورد توجه قرار گرفته است . عنصر بورون مشتق شده از بوریک اسید علاوه بر خاصیت ضد عفونی کنندگی با بیان ماتریکس خارج سلولی باعث افزایش اثرات ترمیمی پوست و مخاط می شود . کلرهگزیدین در کنار بوریک اسید خاصیت ضد عفونی کنندگی این محصول را افزایش میدهد . استیک اسید و ملح آن اثرات سینرژیستی روی خاصیت ضد میکروبی دارند . پلی پروپیلن گلیکول نیز باعث نرم شدن موم گوش می شود . حالت هیدروژلی محصول (کربومر) نوعی پانسمان برای ضایعات و زخم ها محسوب می شود و به حفظ شرایط پایدار پوست و مخاط کمک میکند .

مقدار و روش مصرف :

ابتدا کانال گوش را تمیز کنید . لوسیون گوش را اسپری کرده و پایه گوش را ماساژ دهید . برای درمان روزانه ۲ الی ۳ بار تا بهبودی کامل استفاده نمایید . برای پیشگیری هفتگی ۱ الی ۲ بار استفاده کنید تا گوش ها سالم باقی بمانند .

زمان پرهیز از مصرف :

ندارد

موارد منع مصرف : برای حیواناتی که مجرای گوش مودار یا کانال های گوش تنگی دارند ، مناسب نیست .

تداخل دارویی : ژل بورآز به تنهایی یک ضد عفونی کننده قوی و وسیع الطیف است و ممکن است با سایر داروهای ضد عفونی کننده و آنتی بیوتیکی دچار سینرژسم اثر شود و التهابات را افزایش دهد .

شرایط نگهداری : در ظروف در بسته و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود .

بسته بندی : ظروف ۳۰ میلی لیتری



- استحکام بخش
- ضد عفونی کننده
- ترمیم کننده ناحیه سم
- محلول موضعی

ترکیبات فعال : هر ۱۰۰ میلی لیتر حاوی
 ۳ گرم گلو تار آل دیید
 ۴ گرم بنز آلکانیوم کلراید
 ۱ گرم آلوم
 ۱ گرم روغن کاج



مکانیسم اثر :

از آنجایی که مولکول گلو تار آل دیید دارای دو گروه عاملی آلهیدی است، گلو تار آل دیید می تواند از طریق تراکم، مواد را با گروه های آمین اولیه پیوند دهد. اتصال عرضی این پیوند می تواند پروتئین ها و سایر مولکول هایی را که برای عملکرد طبیعی بیولوژیکی حیاتی هستند، مانند DNA، سفت و غیر فعال کند، بنابراین محلول های گلو تار آل دیید بیوسید های موثری هستند. گلو تار آل دیید یک تا دو میلی متر میتواند به داخل دیواره سم نفوذ کند تا بتواند عمقی تر اثرات ضد عفونی کنندگی نشان دهد. بنز آلکانیوم کلراید با تاثیر بر دیواره سلولی باعث انقباض سیتوپلاسم می گردد و از فعالیت بعضی از آنزیم های حیاتی میکروارگانیسم ها جلوگیری می کند. یون کلر موجود در آن باعث شکسته شدن اتصال بین زنجیره های DNA و یا RNA موجود در ویروس ها می شود. بنز آلکانیوم حتی در غلظت های پایین دارای اثر باکتری سید می باشد. ساختار یون های آلوم، بارهای الکتریکی روی پروتئین های پلاسم را خنثی می کند و باعث انقباض خون می شود و همچنین با جذب آب استحکام سم را افزایش میدهد و از نرم شدن آن پیشگیری میکند. روغن کاج اثرات پوششی و محافظتی روی سم دارد و سرعت ترمیم را افزایش میدهد.

موارد مصرف:

پیشگیری :

- پیشگیری از نرم شدن و افزایش استحکام سم (کف و دیواره سم)
- پیشگیری از عفونت و خونریزی ناحیه سم پس از سم چینی و نعل بندی
- پیشگیری از انتقال عفونت از سوراخ های قدیمی نعل به قسمت های داخلی سم
- استفاده منظم از آلوپاد از ابتدای گاو های سالم به عفونت درماتیت انگشتی و بین انگشتی و فلگمون بین انگشتی در گاو و گوسفند جلوگیری میکند. همچنین باعث کاهش چشمگیر نرخ لنگش در گله های گاو شیری می شود.

درمان :

- درمان بیماری کانکر، تراش (برفک سم)، سیدی تو
- درمان بیماری گندیدگی سم، خط سفید، تیلوما
- درمان و ضد عفونی آبه سم، زخم کف سم



مقدار و روش مصرف :

قبل از مصرف بافت شاخی سم را با برس و آب پاک نمایید . در موارد بیماری جعبه شاخی سم روزانه ۲ بار استفاده شود و طول دوره درمان بسته به تشخیص دامپزشک می باشد . در اسب پس از نعل بندی تمام کف سم و سوراخ های میخ های قدیمی را کاملا اسپری نمایید .

پیشگیری در پیک تولید (حمام سم)	پیشگیری (حمام سم)	درمان موضعی (اسپری)
ساخت محلول ۵٪ ۱۵ لیتر از آلوپاد را در ۳۰۰ لیتر محلول حمام سم حل نمایید . - پس از هر ۱۰۰ گاو ۵ لیتر از آلوپاد به محلول اضافه نمایید.	ساخت محلول ۲٪ ۶ لیتر از آلوپاد را در ۳۰۰ لیتر محلول حمام سم حل نمایید . - پس از هر ۱۰۰ گاو ۳ لیتر از آلوپاد به محلول اضافه نمایید.	۱۰۰٪ به ناحیه سم اسپری شود .
روزانه	۲ الی ۴ روز در هفته	روزانه ۲ بار
طول درمان		

زمان پرهیز از مصرف : ندارد

موارد منع مصرف :

در مواردی که به ترکیبات دارو حساسیت وجود دارد استفاده نشود .

موارد احتیاط :

فقط جهت مصرف دامپزشکی . هنگام کار از دستکش ، ماسک و پوشش مناسب استفاده نمایید . در صورت تماس با چشم ها با آب پاکیزه شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید . به دور از منابع آب و غذا دام ها نگهداری شود .

تداخل دارویی :


قبل ، حین و بعد از آلوپاد ، از سولفات مس استفاده نکنید .

شرایط نگهداری :

در ظروف در بسته و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود .

بسته بندی :

ظروف ۳۰۰ میلی لیتری و ۱ و ۴ لیتری



- ضد قارچ
- لایه بردار
- ضد التهاب
- پماد موضعی

هر ۱۰۰ گرم حاوی
پایه
۱ گرم
۲ گرم
۳ گرم

ترکیبات :
ژله پترولیوم
بوریک اسید
سالیسیلیک اسید
بنزوئیک اسید



موارد مصرف:

- برای درمان عفونت های قارچی پوست در اسب ، گاو ، گوسفند ، بز ، شتر ، سگ ، گربه و پرندگان

مکانیسم اثر :

ژله پترولیوم که به وازلین مشهور است بواسطه پوشش کامل روی موضع درگیر مانع از اکسیژن رسانی می شود و از رشد قارچ جلوگیری بعمل می آورد . مکانیسم اثر اسید بوریک، مهار متابولیسم اکسیداتیو است که باعث کاهش تولید ارگوسترول سلولی و تداخل در تغییر شکل هیف ها (نخینه ها) با مهار رشد آبیکیل از طریق اختلال در اسکلت سلولی قارچ می شود. قارچ ها برای رشد خود از پروتئین کراتین پوست استفاده میکنند و اسید سالیسیلیک با کاهش pH پوست حالت کراتولیتیک دارد و در نتیجه باعث افزایش هیدراتاسیون کراتین و تورم کورنئوسیت ها (سلول های لایه شاخی اپیدرم) می شود. همچنین ماده سیمان بین سلولی را در لایه شاخی حل می کند و لایه برداری را تسهیل می کند. بنزوئیک اسید نیز با ایجاد اختلال در غشای سلولی و مهار رشد قارچ عملکرد ضدقارچی دارد . pH کلی محصول نیز پایین است و در رشد قارچ اختلال ایجاد میکند .

مقدار و روش مصرف :

میزان کافی از پماد را بطور یکنواخت بر روی موضع بمالید .
توصیه میشود حاشیه و اطراف ناحیه درگیر را نیز با پماد پوشش دهید .

زمان پرهیز از مصرف :

موارد منع مصرف : ندارد

موارد احتیاط :

- فقط جهت مصارف دامپزشکی
- فقط جهت استعمال خارجی
- هنگام مصرف حتما از دستکش استفاده شود .
- در صورت بروز التهاب بیشتر ، ضایعات و یا خارش در پوست درمان متوقف شود .
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود .

تداخل دارویی :

استفاده همزمان با سایر داروهای ضدقارچی سبب افزایش سینرژسم اثر می شود و ممکن است سبب افزایش التهاب و ترشحات پوستی شود .
لذا در پروسه درمان همزمان با سایر دروها یا محصولات ضدقارچی دیگر ، استفاده نشود .

شرایط نگهداری :

در ظروف در بسته و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود .

بسته بندی :

تیوب ۴۰ گرمی و کاسه ای ۱۰۰ گرمی





● پروپیلن گلیکول خالص 100%

مکانیسم اثر :

پروپیلن گلیکول می تواند بالانس منفی انرژی را از طریق گلوکونوژنز کاهش داده و سنتز کتون بادی ها را مهار کند. علاوه بر این، پروپیلن گلیکول تولید شیر، تولید مثل و عملکرد ایمنی را با بهبود گلوکز پلاسما و عملکرد کبد در گاوهای دچار کتوزیس، بهبود می بخشد و درصد چربی شیر را کاهش می دهد.

موارد مصرف:

- پیشگیری و درمان کتوز در گاوها
- درمان کبد چرب در گاوها
- درمان توکسمی آبستنی در گوسفند و بز

مقدار و روش مصرف :

• پیشگیری از کتوز : برای گاو شیری ۱۸۰ الی ۲۴۰ میلی لیتر به ازای هر راس ، روزانه ۲- هفته قبل از زایمان شروع شود و برای ۶ هفته بعد از زایمان ادامه یابد .
درمان کتوز : برای گاو شیری ۱۸۰ الی ۴۸۰ میلی لیتر به ازای هر راس ، روزانه - دوز وابسته به شدت بیماریست و تا ده روز میتوان درمان را ادامه داد .

• درمان کبد چرب : ۳۰۰ میلی لیتر روزانه برای ۵ روز

• درمان توکسمی آبستنی در گوسفند :
۶۰ میلی لیتر دوبار در روز یا ۱۰۰ میلی لیتر روزانه برای سه روز



زمان پرهیز از مصرف : ندارد

موارد منع مصرف :

در مواردی که به ترکیبات دارو حساسیت وجود دارد استفاده نشود .

موارد احتیاط :

دوز زیاد پروپیلن گلیکول (بالتر از ۵۰۰ گرم در روز) در گاوها عوارض سمی و جانبی دارد. برای جلوگیری از پنومونی استنشاقی حتما از شربت خوران یا لوله معدی استفاده نمایید . از تجویز دارو بصورت غیر از خوراکی پرهیز شود . در صورت تماس اتفاقی با چشم ، با آب تمیز و فراوان چشم ها شسته شود . در صورت تماس اتفاقی با پوست ، کلیه لباس های آلوده شده را تعویض کنید و محل آلوده شده را با آب و صابون بشویید . در صورت بلع اتفاقی سریعاً به پزشک مراجعه شود . بعد از استفاده دست ها را بشویید .



تداخل دارویی :

در صورت استفاده دراز مدت ممکن است باعث ایجاد اختلالات گوارشی از جمله اختلال در جذب مواد مغذی شود .

شرایط نگهداری :

در ظروف در بسته و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود .

بسته بندی :

ظروف ۲۵۰ میلی لیتری ، ۱۰/۵ و ۴ لیتری





Qs to 100 %
۱۰ گرم
۱ گرم

ترکیبات : هر لیتر حاوی:
پارافین مایع خوراکی
منیزیم هیدروکسید
سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده)

- ملین
- ضد اسید
- ضد نفخ
- سوسپانسیون خوراکی

موارد مصرف:

- برای درمان یبوست
- پرخوری با مواد کربوهیدراته
- اسیدوز شکمبه

- نفخ
- سوءهاضمه
- انباشتگی و زخم شیردان .

مکانیسم اثر :

منیزیم هیدروکسید به عنوان یک ملین ، با افزایش اثر اسمزی در دستگاه روده و جذب آب به داخل عمل می کند. این کار باعث اتساع کولون می شود که منجر به افزایش حرکات پرستالتیک و تخلیه روده می شود. هیدروکسید منیزیم همچنین به عنوان عامل قلیایی عمل می کند تا اسید را خنثی کند. پارافین مایع به عنوان روان کننده مدفوع عمل می کند. سایمتیکون یک ضد نفخ است که کشش سطحی حباب های گاز را تغییر می دهد و باعث می شود گاز راحت تر از بین برود .

مقدار و روش مصرف :

اسب ، گاو : ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ میلی لیتر خوراکی
گوسفند و بز : ۵۰ الی ۱۰۰ میلی لیتر
قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید و محلول را به خوبی قاطی کنید .
در صورت تشخیص توسط دامپزشک ، ۱۲ ساعت بعد تکرار گردد .

زمان پرهیز از مصرف : شیر و یا گوشت : یک روز

موارد احتیاط : هیدروکسید منیزیم یک عامل آلکالینیزه کننده بسیار قوی است و در مقادیر زیاد می تواند pH شکمبه را بسیار بالا ببرد . لذا در موارد انباشتگی ها و یا سوءهاضمه های بدون اسیدوز پس حتما در دوزهای معین شده استفاده شود . مقادیر درمانی توصیه شده بهتر است توسط لوله معدی خورانده شود تا از بروز احتمالی پنومونی استنشاقی جلوگیری بعمل آید . از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری شود و یا در صورت تشخیص دامپزشک تجویز شود . بطور کلی توصیه می شود پس از مصرف پارافین ، آب به میزان لازم نوشیده شود .

تداخل دارویی : در صورت استفاده دراز مدت ممکن است باعث ایجاد اختلالات گوارشی از جمله اختلال در جذب مواد مغذی شود .

شرایط نگهداری : در ظروف در بسته و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود .

بسته بندی : ظروف ۲۵۰ میلی لیتری ، ۱۰۰/۵ و ۴ لیتری



Satinvet



شرکت دانش بنیان ساتین تن کیمیا

(تولید کننده داروهای دامپزشکی و انسانی)

Satin Satinvet

+۹۸ ۴۱ ۳۴۷۵۴۰۳۳

+۹۸ ۹۹۳۸۴۸۴۹۷۷

satinvet

www.satindarou.ir

تبریز، ایران