



بیماری زرد زخم در توله سگ‌ها

Canine impetigo in puppies



زرد زخم

امپتیگو سگ یک مشکل رایج در **سگ های جوان قبل از بلوغ** است که در شرایط نامناسب و غیربهداشتی نگهداری می شوند. این یک بیماری پوستولار غیر فولیکولی non-follicular subcorneal pustular است که توسط استافیلوکوک های کواگولاز مثبت ایجاد می شود. بولوس امپتیگو Bullous impetigo به وضعیت متفاوتی اشاره دارد که در سگ های مسن مبتلا به بیماری های ناتوان کننده یا هورمونی مانند کم کاری تیروئید یا هایپرآدرنوکورتیکسم مشاهده می شود.



شکل 1



شکل 2

بر خلاف زرد زخم در انسان، این بیماری در سگ‌ها غیر مسری است. شرایط نسبتاً خوش خیم است به شرط اینکه عوامل زمینه‌ای از بین بروند و درمان سریعاً انجام شود. درمان خود به خودی نیز تنها با بهبود مدیریت امکان پذیر است.



عوامل زمینه ای عبارتند از:

انگل داخلی و خارجی

عفونت ویروسی مانند دیستمپر سگ. زرد زخم در گذشته از تظاهرات رایج دیستمپر سگ بود، بیماری که اکنون در کشورهای مثل انگلستان غیرمعمول است.

یک محیط کثیف، به عنوان مثال، فروشگاه های حیوانات خانگی که اقدامات بهداشتی ضعیف و ازدحام بیش از حدی دارند.



تشخیص های افتراقی


Demodicosis

Superficial folliculitis

Dermatophytosis

Early scabies

Pemphigus foliaceus



روش های تشخیص

تاریخچه

معاینه بالینی

تست های سیتولوژی

کشت سلولی و حساسیت

نمونه بافتی



درمان

از جمله درمان های رایج استفاده از شامپوهای درمانی همانند کلرهگزیدین یا اتیل لاکتات برای 3 بار در هفته است. در صورت عدم نتیجه، از داروهای آنتی بیوتیکی با توجه به نتایج کشت باید استفاده نمایید.

برای بهبود سریع این بیماری بدون نیاز به آنتی بیوتیک **اسپری دارویی بورآز** بهترین انتخاب است.

اسپری بورآز علاوه بر اینکه عفونت ناحیه را سریعاً کاهش میدهد، به ترمیم ضایعات پوستی نیز کمک میکند. روزانه 3 بار از بورآز بر روی ضایعات استفاده نمایید.