




التهاب کولون (روده بزرگ)

کولیت یک بیماری شایع در سگ ها و گربه ها است که بیشتر با اسهال مزمن با منشأ ناشناخته مشخص می شود. پس از رد کردن بیماری عفونی رایج (انگلی، باکتریایی، قارچی) تغییر رژیم غذایی می تواند علائم بسیاری از بیماران را کنترل کند. در صورت عدم موفقیت، آنتی بیوتیک ها یا NSAID ها توصیه می شود.



التهاب کولون (روده بزرگ)

روده بزرگ به حفظ تعادل مایعات و الکترولیت ها و جذب مواد مغذی کمک می کند. همچنین محل اصلی ذخیره مدفوع تا زمان دفع است و محیطی را برای میکروارگانیسم ها فراهم می کند. اختلال در عملکرد طبیعی کولون منجر به تغییر در جذب و تحرک می شود. از نظر بالینی، این به صورت اسهال روده بزرگ در یک سوم سگ ها ظاهر می شود. کولیت مزمن به التهاب روده بزرگ گفته می شود که حداقل به مدت 2 هفته وجود داشته باشد.



INFLAMMATORY BOWEL DISEASE (IBD) IN DOGS: DON'T BE DECEIVED



PUPPYPOOP.COM

اتیولوژی

التهاب روده بزرگ ممکن است حاد یا مزمن باشد. در بیشتر موارد، عوامل محرک ناشناخته هستند. علل باکتریایی، انگلی، قارچی، تروماتیک، اورمیک و آلرژیک فرض شده است. التهاب ممکن است نتیجه نقص در تنظیم ایمنی مخاطی باشد



برش مقطعی از کولون

نشانه‌ها

شایع‌ترین علامت بالینی کولیت مزمن، **اسهال** روده بزرگ است که با مخاط، هماتوکزی (دفع خون تازه از مقعد)، تنسموس (زورپیچ) و گاهی اوقات درد هنگام مدفوع مشخص می‌شود. اغلب دفعات دفع مدفوع افزایش می‌یابد و حجم مدفوع در هر دفع مدفوع کاهش می‌یابد. کاهش وزن و استفراغ ممکن است رخ دهد اما نادر است. در ابتدا، علائم بالینی ممکن است پراکنده باشد، اما معمولاً پیشرفت می‌کند. معاینه فیزیکی در اکثر موارد قابل توجه نیست. معاینه کامل رکتوم ممکن است پولیپ‌های رکتوم یا نئوپلاسم‌های بدخیم را که می‌توانند نشانه‌های کولیت مزمن را تقلید کنند، نشان دهد.



اصول درمان

1- ابتدا باید علل عفونی را درمان کرد

2- تغییر رژیم غذایی مرحله بعدی است

3- در صورت عدم بهبود، می توان آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد التهابی بالقوه را امتحان کرد .
تنقیه محلول **دارویی بورآز** در کمتر از چند روز علایم را بهبود می بخشد :

التهاب را بسیار کاهش میدهد
اولسرهای ایجاد شده را سریعاً ترمیم می کند
بار میکروبی را کاهش می دهد